

TERAPIA DOŻYLNA
Zapobieganie zakażeniom

Korki dezynfekcyjne
3M™ Curox™
Green means clean





Korki dezynfekcyjne 3M™ Curoso™

Wyjątkowy system, który może pomóc w zredukowaniu zakażeń

Systemy bezigłowe wymagają aktywnej procedury dezynfekcji przed uzyskaniem dostępu dożylnego. Proces ten może wykazywać znaczne różnice – nie tylko pomiędzy szpitalami i instytucjami, ale także między poszczególnymi osobami. Korki dezynfekcyjne Curos to unikatowe pasywne urządzenie dezynfekujące jednorazowego użytku, które chroni system bezigłowy przez okres do siedmiu dni. Zapewnia ono, że jest on zawsze czysty, jak też eliminuje potrzebę aktywnej dezynfekcji, dzięki czemu nie występuje problem zmiennej skuteczności procedur dezynfekcyjnych.

Korek dezynfekcyjny Curos pozwala zaoszczędzić ważny czas opieki klinicznej, ułatwiając oddziałom realizację produktywnego programu pracy dzięki zwiększeniu ilości czasu, który można przeznaczyć na opiekę nad pacjentami.

Korek dezynfekcyjny Curos

Pasywna dezynfekcja. Zawsze czyste.

- ✓ Możliwość kontroli w 100%
- ✓ Widoczny kolor ułatwia monitorowanie przestrzegania zasad¹
- ✓ Eliminuje zmienny czynnik ludzki
- ✓ Standaryzacja praktyki
- ✓ Nie jest wymagane suszenie

VS

Aktualna praktyka

Aktywna dezynfekcja. Zawsze zanieczyszczone.

- ✗ Brak możliwości kontroli
- ✗ Trudno jest osiągnąć wysoki poziom przestrzegania zasad
- ✗ Skuteczność dezynfekcji zależy od użytkownika
- ✗ Brak możliwości standaryzacji praktyki
- ✗ Wymagany czas suszenia

“Korki dezynfekcyjne Curos zapewniają nam spójną i niezawodną dezynfekcję, niezależnie od tego, kto je zakłada. Umożliwiają nam również aktywne zarządzanie tym procesem w celu poprawienia ogólnej praktyki i przestrzegania zasad.”

Pielęgniarka oddziałowa na OIOMie

Według pracowników szpitala częstość występowania związanych z cewnikiem zakażeń krwi wynosiła **ZERO** w pierwszych dwóch kwartałach 2010 r. po wprowadzeniu dezynfekujących korków 3M™ Curosin™.

Korek dezynfekcyjny Curosin

Wytyczne SHEA: Specjalne metody zapobiegania CLABSI – do zabezpieczenia systemów bezigłowych należy stosować osłonę środek antyseptyczny (jakość dowodów: I).²

Badania wykazały, że korki dezynfekcyjne Curosin mogą zredukować częstość występowania związanych z cewnikiem zakażeń krwi (CRBSI)²

Spadek

o 87%

częstości występowania zakażeń w oddziale onkologicznym³

Spadek

o 73%

częstości występowania zakażeń związanych z cewnikiem wewnątrznaczyniowym¹

Spadek

o 70%

częstości występowania zakażeń w projekcie zapobiegania zakażeniom u noworodków⁴

Spadek

o 68%

częstości występowania zakażeń na oddziale intensywnej opieki medycznej⁵

Spadek

o 66%

częstości występowania zakażeń u pacjentów otrzymujących domowe żywienie pozajelitowe⁶

Jakie mogą być korzyści finansowe ze stosowania korków dezynfekcyjnych Curosin?

PLN 750 000 PLN

– szacowane roczne oszczędności na oddziale onkologicznym³

Zeskanuj kod, aby odwiedzić stronę www.disinfectingcap.co.uk

Zeskanuj ten kod QR za pomocą smartfona lub tabletu, aby zapoznać się z korzyściami wynikającymi ze stosowania korków dezynfekcyjnych Curosin w praktyce klinicznej.



Zeskanuj kod, aby obejrzeć film „Korzyści ze stosowania Curosin”



Dezynfekujące korki dezynfekcyjne 3M™ Curoso™ są dostępne w trzech wersjach:

- 1 Pasek z dezynfekującymi korkami do systemów bezigłowych 3M™ Curoso™** – na łatwo dostępnym dozowniku, który można umieścić obok łóżka pacjenta. Pasek z dziesięcioma zakrętkami na folii, idealny do umieszczenia przy łóżku pacjenta, zwiększa poziom przestrzegania zaleceń przez pielęgniarki o 63% do 80%.¹
- 2 Pojedynczy korek dezynfekcyjny Curoso**, przeznaczony do stosowania w warunkach klinicznych, gdzie istnieje wyznaczone miejsce do przechowywania tego typu akcesoriów przy łóżku pacjenta.
- 3 Pudełko dla pacjentów**, którzy wracają do domu ze szpitala z założonymi długimi okresami cewnikami lub otrzymującymi leczenie dożylnie.



Kod Vygon	Opis	Liczba w pudełku
CFFI-270R	Pojedynczy korek dezynfekcyjny Curoso	270/pudełko
CFFI0-250R	Pasek korka dezynfekcyjnego Curoso	250/pudełko
CM5-200R	Korki dezynfekcyjne na pasku do męskich końcówek typu luer	200/pudełko
CTGI-270	Curoso korki dezynfekcyjne do łączników dylatacyjnych "Tego"	250/pudełko

References

1. The Journal of the Association for Vascular Access: Volume 17 Number 4; December 2012 Central Venous Catheter Protective Connector Caps Reduce Intraluminal Catheter-Related Infection Chuck Ramirez, BA, RRT, VA-BC; Antonina M. Lee, MEd, MPH, RN, CIC; Ken Welch, MD
2. SHEA Guidelines: Strategies to Prevent Central Line-Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update, June 2014 vol. 35, no. 7, Page 757
3. Impact of alcohol-impregnated port protectors and needleless neutral pressure connectors on central line-associated bloodstream infections and contamination of blood cultures in an inpatient oncology unit, Michael A. Sweet, PharmD; Aaron Cumpston, PharmD; Frank Briggs, PharmD; MPH, Michael Craig MD and Mehdi, Hamadani, MD, American Journal of Infection Control: Volume 40 Number 10; December 2012
4. Neonatal Infection Prevention Project in Association with, California Perinatal Quality Care Collaborative (CPQCC), 2012 California Children's Services (CCS), 2006-2012 Update
5. Reduction of Central Line Associated Bloodstream Infection (CLABSI) in a Neonatal Intensive Care Unit with Use of Access Site Disinfection Caps Rady Children's Hospital San Diego, San Diego, CA: Alice Pong, MD; Cindy Salgado, BSN, PHN, MBA, CIC; Mark Speziale, MD, PhD; Peggy Grimm, MS, RNC-NIC; Chris Abe, BSN, CIC
6. The Effect of 70% Isopropyl Alcohol Port Protection on Central Venous Catheter-Related Infection in Patients on Home Parenteral Nutrition St. Mark's Hospital, Harrow, UK: Mia Small, MSc, BSc (Hons), RGN, DipNutr; RINutr:



Autoryzowany dystrybutor
wyrobów medycznych

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji są proszone o kontakt pod adresem email: biuro@vygon.pl

Vygon Polska Sp z o.o.
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa
tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54



www.vygon.co.uk